

Privátní gynekologická ambulance MUDr. Jany Hrbkové

Klíšská 330/163, 400 01 Ústí nad Labem, tel.:475 211 431

Informovaný souhlas s užíváním hormonální antikoncepce

Jméno, příjmení:

RČ:

Prohlašuji, že jsem byla dostatečně informována o hormonální antikoncepci a bylo mi doporučeno prostudování příbalového letáku.

V rodině se nevyskytla trombóza či embolie, byl mi změřen krevní tlak. Byla jsem informována, že hormonální antikoncepce (dále jen HAK) je spolehlivá, jestliže se bere pravidelně. Po déle jak 12 hodinách zapomenutí, již není spolehlivá. Účinnost HAK může ovlivnit zároveň průjem, zvracení či současné užití některých antibiotik.

Hormonální antikoncepce může mít (většinou přechodné) nežádoucí účinky, např. nepravidelné špinění či krvácení, zvětšení a citlivost prsů, pobolívání v podbřišku, bolesti hlavy. Neustoupí-li do 3-4 měsíců, měla bych konzultovat svého lékaře.

Rizikem užívání HAK je, že může zvyšovat krevní srážlivost, proto zvyšuje riziko ucpání cév krevní sraženinou (trombóza) a embolie (putování krevní sraženiny krevním oběhem). Toto riziko dále zvyšuje věk nad 35 let, kouření, dlouhodobé znehybnění (např. sádra po úraze, stav po operacích). V takových situacích je vhodné HAK vysadit. V jiných rizikových situacích jako např. cestování dálkovými lety je vhodný maximálně možný pohyb (např. projít se každé 2 hodiny letadlem).

Existuje malá část populace, která má geneticky danou poruchu krevní srážlivosti, tzv. přítomnost trombofilní mutace. Vyšetření trombofilních mutací je hrazeno zdravotní pojišťovnou před nasazením HAK jen v indikovaných případech (výskyt trombóz či embolií v rodině). Byla jsem ale informována, že si jej mohu hradit jako samoplátkyně, tzv. A-test. V případě, že tato porucha krevní srážlivosti není odhalena, může se díky nasazení HAK projevit výskytem trombózy.

Důvodem k okamžitému vysazení HAK je jednostranný otok dolní končetiny či neobvyklá bolest hlavy. V takovém případě ihned navštívím praktického lékaře.

V Ústí nad Labem dne

.....
(podpis)