

Informovaný souhlas se zavedením nitroděložního tělíška

Jméno, příjmení:

RČ:

Žádám o zavedení nitroděložního tělíška:

1) nehormonální

2) hormonální - Mirena

Byla jsem informována, jak nitroděložní tělíško funguje, ohledně jeho antikoncepční účinnosti (žádná antikoncepce není 100% spolehlivá) i o možných nežádoucích účincích:

1. prodloužení a zesílení menstruačního krvácení u nehormonálních tělíšek
2. u tělíška s gestagenem (Mirena) může dojít k nepravidelnému špinění či krvácení, které obvykle mizí do 3-6 měsíců; cca z 20% může nastat úplné vymizení menstruačního krvácení
3. dočasná bolest podbříšku těsně po zavedení tělíška
4. není-li kanál děložního hrdla dostatečně volný, může velmi vzácně při obtížnějším zavedení dojít i k poranění dělohy - proražení stěny děložní
5. zavedením nitroděložního tělíška může vzniknout děložní zánět

Dále jsem byla informována o možných dlouhodobých komplikacích spojených se zavedením tělíška - zejména u nehormonálních tělíšek může vznikat zánět v děloze, často spojený s bolestí břicha, větší než při menses, s krvácením mimo cyklus, horečkou, který, není-li včas léčen, může mít za následek neprůchodnost vejcovodů.

Ve vzácných případech může tělíško vypadnout z dělohy ven. Mirena může vzácně vycestovat do dutiny břišní, kdy je pak nutné ji laparoskopicky vyjmout. Proto jsou nutné pravidelné gynekologické kontroly.

I při zavedeném nitroděložním tělísku může vzniknout těhotenství nebo mimoděložní těhotenství. Při první absenci menses je nutné provést těhotenský test.

Byly mi podrobně zodpovězeny všechny mé dotazy.

V Ústí nad Labem dne

.....
(podpis)